

## 11 AYLIK TORSİONE OLMUŞ İNMEMİŞ TESTİSLİ BİR OLGU

Dr. Nîmet YAVILIOĞLU (x)

Dr. Gözen GÜREL (xx)

Dr. Erbil ERGENEKON (xxx)

Dr. Serafettin ERDOĞAN (xxxx)

### GİRİŞ

Spermatik kordun torsionu, tamamen prepubertal çocuklarda, nadir görülen bir hastalıktır. Vasküler pediküle göre iki tipi vardır,

1-Extravaginal torsion: Testis epididimis ve peritoneal kılıflar vertikal aks etrafında external inguinal ring üzerinde dönme gösterir.

2- Intravaginal torsion: Tunika vaginalisin anormal suspansiyonundan ötürü epididimisle testisin dönmESİdir.

Ayrıca testis ve epididimisin appendiksini torsionu vardır. Testis ve epididimislerin üst polünde sapsız, faydası olmayan ilavelerinin torsionudur.

Testis torsionu prepubertal çocuklarda görülmesine rağmen 11 aylık çocukta inmemiş testiste görülmesi fevkalede nadirdir. Bu nedenle biz bu olguya yayılmayı uygun gördük.


### OLGU TAKTİMİ

11 aylık M.A., sol testisinin yerinde bulunmayı, sol kasiğında ağrılı şişlik şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Hikayesinden testisinin doğuştan beri yerinde olmadığı, kasiğındaki şişliğin 4 gün önce başladığı, şişliğin kızarık ve çok ağrılı olduğu, zaman zaman ateşinin yükseldiği, bize gelmeden önce Dr. a başvurduğu, ilaçlar kullandığı, fakat ağrı ve şişliğin gittikçe arttığı öğrenildi.

Fizik Muayenede., Ateş 37°C, Nabız, 136/dk, Hb., 11,5 gr., B.K., 19 000, sol testis scrotumda palpe edilemedi. Sol inguinal bölgenin ceviz cesametinde sert, çok hassas bir kitle saptandı.

(xx) Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji Kl. Öğretim Üyesi  
x,xxx,xxxx Aynı Klinik Uzmanları

Acil olarak ameliyata alınan hastada, kitlenin testis olduğu ve saat yelkovanının tersi istikametinde dönmüş olduğu testis ve epididimis dokusunun gangrene olduğu görüлerek orkiktomi yapıldı.




### TARTIŞMA

Taradığımız ilmi kaynaklara göre 1 yaşın altında testis torsionu görülmüş olmasına rağmen, çok nadirdir. (1,2) Bizim olgumuz 11 aylık, inmemiş testisli ve intravaginal torsion şeklindeydi.

Torsione olmuş testis 4-6 saat içinde, % 1 lik 10-20 ml. procaine hidrochloride yapılarak detorsione edilebilir. (1) Ancak bu olgu başvurduğunda 4 gün geçmişti ve gangrene olmuştu. Literatüre uygun olarak sol testis saat yelkovanının tersi istikamete dönmüştü. (1,3) Aksi istikamete  $720^{\circ}$  döndürülerek  $10^{\circ}$  beklenmesine rağmen, renkte bir düzeltme olmayınca orkiktomi yapıldı.

Ayrıca 1 yaşın altında inmemiş testiste torsion, kaynaklarda rastlanılmamıştır.



## SONUÇ

Prepubertal dönemde testis torsionu olmasına rağmen, inmemiş testisli ve 1 yaşın altındaki çocuklarda ilmi kaynaklarında rastlanılmamasına karşın, tarafımızdan bir olguda müşahade edilmiştir.

## ÖZET

Nadir görülen 11 aylık inmemiş torsione testisli bir olgu taktim edildi, konu kısaca tartışıldı.

## SUMMARY

An elevenMonths old, rare case with retensive torsioned testis submitted and discussed briefly.

## YARARLANILANKAYNAKLAR

- 1- SMITH, Donald. R., General Urology, San Francisco, California, pp. 397-398, June, 1972.

- 2- JEFTS, Robert. D.M.D., The Urologic Clinics of North America, Congenital Anomalies of the Lower genitourinary Tract, Volum 5, Number 1, pp. 239-242, February 1978.
- 3- CAMPBELL AND HARRISON. M.D. UROLOGY, W.B. Saunders Company, Third Edition, Volum 2, pp. 1632-1644, 1855-1860, 1970.