

Dermatoloji Kliniğinde Son dört Yılda Görülen Pemphigus Olguları

Dr. Gönül Ergenekon (x)

Dr. Ayten Ural (xx)

GİRİŞ VE AMAÇ

Pemphigus etyolojisi belli olmayan büllerle seyreden hastalıklara verilen bir isimdir. (1,2,3)

Hastalık her ırkta bulunur orta yaşlılarda (40-50) görülür I. (1,2,3,6)

Etyolojisi henüz tam manasıyla aydınlanmış değildir. Viruslar sorumlu tutulmuşsada hastalığa sebep olan virus bulunamamıştır. (1) Immun Fluoresans tekniği ile yapılan araştırmalarda pemphigus lezyonlarında ve sağlam gibi görülen deri kısımlarında antikorların mevcudiyeti ortaya konulmuştur. Epidermis hücrelerinde teşekkül eden bu antikorların spesifik karakterde olup jonksyon bölgesine karşı husule gelmekte ve yalnız pemphiguslu hastalarda görülmektedir. (2,4)

Aynı zamanda HLA-13 antigenin artmış olarak bulunmuş olması genetik olabileceği şüphesini yermektedir (5)

Pemphigus grubundaki hastalıklar klinik görünüş ve seyirlerine göre muhtelif klinik formlar göstermektedir. P vulgaris, P. vejetan, P. foliaceus, P. seborrhoeicus gibi bütün bu klinik şekillerin kendilerine has özellikleri olmakla beraber klinik evolutif ve histolojik bir çok ortak tarafları mevcuttur. (12,3,5)

Pemphigus, klinik seyrinin ağır olması ve fatal olarak sonuçlanması aynı zamanda etyolojisinin tam aydınlığı kavuşamamış olması nedeniyle üzerinde en çok çalışma yapılan hastalıklardan birisidir. Bizde böyle bir hastalığın kliniğimizde son 4 yılda yatan diğer deri hastalıklarına göre oranını araştırmak amacıyla bu incelemeyi yapmış bulunuyoruz.

MATERYAL VE METOD

1978-1981 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Bilim Dalında yatırılarak tedavi gören hastalardan; Klinik ve Histopatolojik ola-

(x) Atatürk Üniv. Tıp Fakültesi Dermatoloji Bilim Dalı Doçenti

(xx) " " " " " " Profesörü

rak pemphigus tanısı konulan 52 hasta üzerinde çalışıldı. Bu hastaların arşivimizde bulunan histopatolojik preparatları yeniden gözden geçirildi. Hastaların yaşa, cins ve klinik tiplere göre dağılımı incelendi. Aynı zamanda hastaların anemlelerine dikkat edilerek başlangıcı MATERY lezyonunun yeri ve ailelelerinde aynı hastalığın olup olmadığı araştırıldı.

BULGULAR:

Dermatoloji kliniğinde 1978-1981 yılları arasında yatırılan hastaların % 4,16 sını pemphiguslular oluşturmaktadır. En genç hasta 13 en yaşlı hasta ise 80 yaşındaydı. Yaş ortalaması 40,23 idi 52 pemphiguslu hastanın 27 (% 51,92) si kadın, 25 (% 48,07) si erkekti.

Hastaların yaşa, cinsiyete ve yıllara göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmektedir.

Tablo 1: Pemphiguslu Hastaların Yıllara, Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Yıllar	Yaş ve Cinsiyet														Genel Toplam		
	0-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60			Toplam	
	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E			
1978	—	—	—	1	—	—	2	1	2	5	—	1	—	1	4	9	13
1979	—	—	—	1	—	1	1	—	1	3	—	—	—	—	2	5	7
1980	—	—	—	—	2	—	1	3	3	—	2	2	—	10	5	15	—
1981	—	—	—	—	1	1	3	2	4	2	1	—	2	1	11	6	17
Toplam	—	—	—	2	3	2	7	6	10	10	3	3	4	2	27	25	52
G Toplam	—	—	—	2	5	—	13	—	20	—	6	—	6	—	52	—	—

Hastaların 38 (% 73,07) sinde lezyonlar ağızdan başlamasına karşılık 14 (% 20,92) hastada lezyonlar vücudun çeşitli yerlerinden başlamıştı.

Hastaların hiçbirinde aile hikayesi yoktur.

Pemphiguslu 52 hastanın 41 (% 78,84) P vulgaris 6 (% 11,53) ü P vegetan, 1 (% 1,92) si P foliaceus, 4 (% 7,69) P seborrheicuslu idi Pemphiguslu hastaların klinik tiplerine, yaş ve cinsie göre dağılımı tablo 2 de görülmektedir.

Tablo 2: Pemphiguslu Hastaların Klinik Tiplerine, Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Klinik Tipleri	Yaş ve Cinsiyet														Genel Toplam		
	0-9		10-19		20-29		30-39		40-49		50-59		60			(Toplam)	
	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E	K	E			
P. vulgaris	—	—	—	2	2	2	5	4	8	9	3	2	3	1	21	20	41
P. vegetan	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	1	—	5	1	6
P. foliaceus	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
P. Sebereuus	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	3	4
Toplam	—	—	—	2	3	2	7	6	10	10	3	3	4	2	27	25	52
G.Toplam	—	—	—	2	5	—	13	—	20	—	6	—	6	—	52	—	—

Hastaların klinik tiplere dağılımı şekil de sütun grafiyle açıkça gösterilmektedir.

TARTIŞMA

Etiyolojisi henüz tam manasıyla aydınlanmamış bir hastalık olan pemphiguslu olgular, kliniğimizde yatan diğer deri hastalıklarının % 4,16 sını teşkil etmektedir. Hastalığın görülme oranını gösteren bir kaynağa raslamadık. Bizim bulduğumuz oran pek nadir raslanan bir hastalık olmadığını göstermektedir.

Hastalarımızın yaş ortalaması 40,23 idi Kaynaklarda pemphigus gurubu için orta yaş hastalığıdır denmektedir (1,2,3,5,8) bulgumuz buna uymaktadır.

Pemphiguslu hastalarımızın % 51,92 kadın % 48,07 si erkekti. Kaynaklarda cins ayrımı hususunda tam bir fikir birliği tesbit edemedik. Lever (8) kadınlarda daha çok olduğu ileri sürmesine rağmen, bazı yaralar pemphigus grubunun her iki cinsi eşit miktarda tuttuğunu ileri sürmektedirler (6,7,8,9) Bizimde elde ettiğimiz bulgular bunu desteklemektedir.

Hastalarımızın ekseriyetinde % 73,07 sinde lezyonlar ağızdan başlamaktadır. Kaynaklarda (1,2,3,9) gösterilen genellikle lezyonun başlama yerine uymaktadır.

Pemphiguslu hastalarımızın hiçbirinde aile hikayesi saptamadık. Bu bulgumuzda kaynak (5,9) bulgularla uygunluk göstermektedir.

Klinik tip olarak en çok P vulgarisi % 78,84 olarak saptadık. Diğer klinik tiplere tipleri daha küçük oranlarda bulduk yaptığımız kaynak araştırmalarında, hastalığın klinik tiplere dağılımını inceleyen kaynaklarla (10,11) bulgumuz uygunluk göstermektedir.

Sonuç:

Kliniğimizde son 4 yılda yatmış olan hasta materyalinden yaptığımız incelemede; hastaların % 4,16 sını pemphiguslu hastaların oluşturduğunu gördük. Bu hastalığın pek nadir bir hastalık olmadığını kanısına vardık.

Özet:

Kliniğimizde 4 yılda yatan hastalar arasındaki pemphigus vakalarının görülme oranı incelendi.

Summary:

Pemphigus cases observed in our clinic, in the last four years,

The rate of the cases with pemphigus among the hospitalized patients in our clinic in the last four years were reviewed

KAYNAKLAR

- 1- Tat, A.L ve arkadaşları: *Deri ve Zührevi Hastalıkları (Ders Kitabı) Yargıs-
oğlu Matbaası Ankara 1977, 163*
- 2- Nemlioğlu, F.: *Deri hastalıkları, Nazım Terzioğlu Matematik Araştırma Ens-
titüsü Baskı atölyesi İstanbul 1979, 339*
- 3- Moschella, S.L.; *Dermatology, W.B. Saunders Company, Philadelphia,
phia. 1975, vol*
- 4- Lever, W.C, and Goldberg, H.S.: *Treatment of Pemphigus vulgaris with
methorterexate, Arc Derm : 100: 70 1969*
- 5- Fitzpatrick, T.B., et al *Dermatology in General Medicine Second edition,
Mc Graw-Hill Book Company 1979, 310*
- 6- Domonkos, U.N.: *Andrews Diseases of the skin, Clinical dermatology WB
Saunders company, Philadelphia, 1971, 564.*
- 7- Asboe- Hansen, G.: *Diagnosis of Pemphigus, Brit. J. Derm. 83-81, 1970.*
- 8- Lever, W.N., : *Pemphigus and Pemphigoid Amerikan lectures in Dermatology,
Charles c thomas, Publisher sprinofield illinois USA, 1964. 1*
- 9- Krain, L.S.: *Pemphigus : Epidemiologic and survival characteristics of 59
Patients, 1955-73. Arch. Dermatol 110: 862-865. 174.*
- 10- Rosenberg, F.R, et al *Pempihigus Arch. Derm., 112, 7: 1960, 1976*
- 11- Hirane, T.: *Pemphigus: Survey of 85 Patients between 1970 and 1974. in
year book of Dermatology ed. Richard L. Dobsan. year book medical publc-
hers Chicago. Landon 1979 pp. 137-138.*